


[第9回目] 運動方程式を解く 3 : 単振動

≪今日の授業の目標≫

◎ 弾性力が作用するときの運動方程式とその解

[三角関数, 単振動]

弾性力  $F_x(t) = -kx(t)$  ※  $x$  は自然長からの伸び



↓ 立てる

$$\begin{aligned} \text{運動方程式: } ma_x(t) = -kx(t) &\rightarrow a_x(t) = -\frac{k}{m}x(t) \\ &\rightarrow \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -\frac{k}{m}x(t) \quad \dots \textcircled{1} \quad (\text{2階の微分方程式}) \end{aligned}$$

一般解:  $x(t) = A \cos(\omega t + \alpha)$  ※  $\cos$  の ( ) の中身の単位は [rad] (ラジアン)

: 単振動 simple harmonic oscillation

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \alpha) \quad (\leftarrow \text{座標 } x(t) \text{ を時間で微分して求める})$$

A : 振幅 [m] (任意定数) amplitude

$\alpha$  : 初期位相 [rad] (任意定数)

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} : \text{角振動数 [rad/s]}$$

(←速度  $v_x(t)$  をさらに時間で微分して  
加速度を求め, ①と比較する。)

$$\left[ \begin{array}{l} \text{周期: } T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ [s]} \quad \text{period} \\ \text{振動数: } f = \frac{1}{T} \text{ [Hz]} \quad \text{frequency} \end{array} \right]$$

学習到達目標 (5) 単振動の運動方程式を解くことができる。

次回予定 [第10回目] 仕事 (教科書 66~68 ページまで)

\*\*\*\*\*  
レポート問題 第9回目 (右側の半分の解答用紙を切り取って提出しなさい)

数値で計算する問題は, 答えにも必ず単位をつける! MKS 単位系で答えること!

B... 問1 教科書 53 ページの演習問題 B を答えよ。

B... 問2 教科書 52 ページの演習問題 A (a) (b) を答えよ。

=====

中間テスト直し 12月13日 (月) 13:00まで

1月13日 (木) 4時限目に補講の予定。

〆切を守って提出したレポートが8回以上ない者は, 総合得点から10点減点する。

1回目~7回目の未提出のレポートは早急に提出すること。(11回以上提出が必須)


前半の遅れたレポートは今後受け取らない。

✓切を必ず守ること

解答用紙 (授業 曜 限) 学籍番号 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

数値で計算する問題は, 答えにも必ず単位をつける! 指示がない限り MKS 単位系で答えること!

問 1 (a)  $F_x(t) =$



(b) 運動方程式: \_\_\_\_\_,  $a_x(t) =$

(c) \_\_\_\_\_  
 $x(t) = A \cos( [ \quad ] t + \alpha ) [m]$

c-1)

c-2)  $v_x(t) =$

(d) 初期条件: \_\_\_\_\_ と


$A \cos \alpha =$  \_\_\_\_\_,  $A \sin \alpha =$  \_\_\_\_\_

d-1)

$A =$  \_\_\_\_\_,  $\alpha =$  \_\_\_\_\_

d-2)  $x(t) =$

(e)  $\omega =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ],  $T =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ]




問 2 (a) a-1)  $\theta(t) =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ], a-2)  $A =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ]


a-3)  $\omega =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ], a-4)  $f =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ],

a-5)  $T =$  \_\_\_\_\_ [ \_\_\_\_\_ ]

(b) b-1)  $x[m]$



b-2)  $x[m]$



☆このレポートをやるのに \_\_\_\_\_ 時間 \_\_\_\_\_ 分,  
 それ以外に力学 I の予習復習を \_\_\_\_\_ 時間 \_\_\_\_\_ 分した。